

造影CT検査 予約票

_____様

【検査部位】 頭部 ・ 胸部 ・ 腹部 ・ 骨盤腔 ・ ()

【造影剤使用】 あり

【検査日時】 _____年____月____日____曜日 午前 ・ 午後 ____時____分

※ 検査予約時間の 20 分前までにご来院下さい

※ 予約日時にご来院出来ない場合はお早めにご連絡ください

—————CT検査はエックス線を用いる検査です—————

検査前のお願い

1. 検査当日の【朝食 ・ 昼食】は食べずにご来院下さい。
2. 腹部、骨盤腔の検査は、検査の1～2時間前から排尿（オシッコ）をしないでください。
3. ビグアイド系の糖尿病薬は医師指示のもと

検査前2日・検査後2日（合計4日間）の服用はお止めください。

〈ビグアイド系糖尿病薬〉

メトグルコ錠・メトホルミン塩酸塩錠・メタクト配合錠・グリコラン錠・エクメット配合錠
イニシンク配合錠・ジベトス錠・ジベトンS腸溶錠 など

★次の口の中のものには身につけて検査が出来ません。検査前に外していただきます。

頭の検査

補聴器・入れ歯・かつら・ヘアピン・眼鏡など・ピアスなど

胸・腹の検査

金属やプラスチック：ネックレス・ブラジャー・コルセット・ファスナーなど

貼り薬：湿布・エレキバン・カイロなど

- ・検査時間は、15分～30分程度になります。
- ・検査開始時間は進捗状況により前後することがありますので予めご了承ください。
- ・予約時間を過ぎると検査できない場合がありますので予めご了承ください。
- ・予約時間までにご来院できない場合は、必ず電話連絡をお願いします。
- ・妊娠中または妊娠の可能性のある方は検査を行うことができない場合がありますので、スタッフにお知らせください。
- ・別紙『CTの造影剤使用に関する説明書』をお読みください。

社会福祉法人 浅草寺病院 電話 03-3841-3330

CTの造影剤使用に関する説明書

【造影剤について】

今回実施するCT検査はヨード造影剤という薬剤を使用します。造影剤は、病気の有無や性質、範囲を正確に評価するために用いられるものです。造影剤を使用するかどうかは、検査の目的や部位によりさまざまですが医師により判断されます。

今までに造影剤で副作用の起こった方は、原則として造影剤は使用できません。副作用歴のある方は必ずお知らせください。

【造影検査当日の流れについて】

1. 検査当日の食事は6時間前までとしてください。
2. 検査を始める前に点滴を行います。
3. 検査中・検査終了後気分が悪くなったら、すぐにお申し出ください。
4. 検査終了後、造影剤はすべて尿として排泄されますので、当日はお水やお茶などの水分を多めに飲んでください。食事は普通に取られてもかまいません。なお、水分制限されている方は担当医師にお申し出下さい。

【副作用について】

造影剤を使用すると、まれに副作用が起きることがあります。ぜんそくやアレルギー体質でこの確率は高くなります。副作用の種類は次のようなものです。

1. 軽い副作用

吐き気、かゆみ、くしゃみ、咳、咽喉頭（のど）違和感、動悸、頭痛、発疹などです。造影剤投与直後に現れることが多いですが、検査の1～2日後に発生することがあります。これらは治療を要さないか、投薬や注射が必要となる場合があります。

2. 重い副作用

呼吸困難、ショック、意識障害、血圧低下、腎不全などです。このような副作用は、入院治療が必要です。場合によっては後遺症が残る可能性もあります。発生確率は0.01%～0.02%です。また、症状・体質によっては、0.0005%～0.001%（10～20万人に1人）で死亡する場合があります。

これらの症状は造影剤使用直後から1時間以内に生じることがほとんどです。検査中はスタッフが状態を注意深く観察していますので、体調の異変を感じられた方はすぐにお申し出ください。

ごくまれに検査後数時間から数日後に発疹、吐き気、かゆみなどの遅延性の副作用が現れることがあります。症状発現時には受診していただく場合がありますので、下記連絡先までご連絡ください。

